



**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ**

Ул. Ленина, д. 51, г. Пермь, 614006
Тел. (342) 217 79 00; факс (342) 217 76 81
E-mail: info@minzdrav.permkrai.ru
ОКПО 01970367, ОГРН 1065902004629,
ИНН/КПП 5902293308/590201001

31.01.2017 № СЭД-34-01-10-396

На № _____ от _____

О направлении материалов

Главным врачам государственных
медицинских учреждений

Уважаемые коллеги!


Во исполнение приказа Министерства здравоохранения Пермского края от 26 декабря 2016 года № СЭД-34-01-06-1014 «Об усилении мероприятий по кори» направляем информационно-просветительские материалы для населения о профилактике кори для использования в работе.

- Приложение:
1. Информационно-просветительские материалы для взрослых на 2 л. в 1 экз.
 2. Информационно-просветительские материалы для детей на 2 л. в 1 экз.
 3. Информационно-просветительские материалы для населения на 2 л. в 1 экз.
 4. Информационно-просветительские материалы для педагогов на 2 л. в 1 экз.

Заместитель ^{и.о.} министра

Л.Н. Чудинова

Д.А. Арбузова
8(342)235-15-98



Приложение к письму
Министерства здравоохранения
Пермского края №1

Информационно-просветительские материалы для взрослых.

В настоящее время ситуация по заболеваемости корью в Российской Федерации стабильна, но имеется опасность завоза случаев кори в связи с прибытием беженцев с Украины, мигрантов из ближнего зарубежья и при выезде туристов и паломников в неблагоприятные страны по кори.

Корь – острое инфекционное вирусное заболевание с высоким уровнем восприимчивости, которое характеризуется высокой температурой, воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и характерной пятнисто-папулезной сыпью кожных покровов, общей интоксикацией.

Пути передачи:

- Воздушно-капельный, вирус выделяется во внешнюю среду с капельками слизи при кашле, чихании и с воздухом переносится на большие расстояния – в другие помещения, этажи.

Источник инфекции:

- Больной корью заразен для окружающих с последних дней инкубационного периода (за 2-5 дней до клинических проявлений) и до 4-го дня после высыпаний.

Кто болеет:

- Не болевшие корью и не имеющие прививки от кори.

Иммунитет:

- Новорожденные дети имеют иммунитет, переданный им от матерей, если те переболели корью или были привиты от кори ранее. Этот иммунитет сохраняется первые 3 месяца жизни.
- После перенесенного заболевания развивается стойкий иммунитет, повторное заболевание корью человека, без сопутствующей патологии иммунной системы, сомнительно, хотя и такие случаи описаны.

Симптомы:

- Инкубационный период до 21 дня, чаще 9 – 11 дней.
- Острое начало – подъем температуры до 38 – 40 °С.
- Сухой «лающий» кашель, осиплость голоса, насморк.
- Светобоязнь, головная боль, отёк век и покраснение конъюнктивы.
- Гиперемия зева и коревая энантема – красные пятна на твердом и мягком нёбе.
- На 2-ой день болезни на слизистой щек у коренных зубов появляются мелкие белесые пятнышки, окруженные узкой красной каймой.

- Поэтапное появление сыпи на 4 – 5-й день болезни, сначала на лице, шее, за ушами, на следующий день на туловище и на 3-й день высыпания покрывают разгибательные поверхности рук и ног, включая пальцы. Сыпь состоит из мелких папул, окруженных пятном и склонных к слиянию (в этом ее характерное отличие от краснухи, сыпь при которой не сливается).
- Обратное развитие элементов сыпи начинается с 4-го дня высыпаний: температура нормализуется, сыпь темнеет, буреет, пигментируется, шелушится (в той же последовательности, что и высыпания). Пигментация сохраняется 1 – 1,5 недели.

Осложнения:

Вирус кори снижает общий и местный иммунитет, в результате снижается сопротивляемость организма и развиваются осложнения:

- Ларингит
- Бронхиолит
- Энцефалит
- Менингит
- Пневмония
- Поражение зрительного и слухового нервов
- Отит
- Конъюнктивит
- Стоматит
- Гепатит и др.

При появлении первых признаков заболевания необходимо:

- остаться дома
- ограничить контакты
- срочно вызвать врача на дом!

Профилактика:

Единственный эффективный метод защиты от кори – ВАКЦИНАЦИЯ!

В соответствии с Национальным календарем профилактических прививок Российской Федерации прививки против кори проводятся детям в 1 год и в 6 лет и взрослым до 55 лет, не болевшим и не привитым против этой инфекции по схеме.

* Внесены изменения к Национальному календарю приказом МЗ РФ от 16.06.2016 № 370Н